

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Loargys 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni pegzilarginase

▼ Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista' tgħin billi tirrapporta kwalunkwe effett sekondarju li jista' jkollok. Ara t-tmiem ta' sezzjoni 4 biex tara kif għandek tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tinghata din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-infermier tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwix elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhum Loargys u għal xiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tinghata Loargys
3. Kif jinghata Loargys
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Loargys
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra
7. Istruzzjonijiet għall-użu

1. X'inhum Loargys u għal xiex jintuża

Loargys fih is-sustanza attiva pegzilarginase, li hija enzima umana modifikata prodotta mit-teknoloġija tad-DNA rikombinanti. Il-mediċina tintuża biex tittratta defiċjenza ta' arginase 1 (ARG1-D), magħrufa wkoll bħala hyperargininemia, fl-adulti, adolexxenti u tfal minn sentejn 'il fuq.

Il-pazjenti b'ARG1-D għandhom livelli baxxi ta' enzima msejja arginase. Din l-enzima tgħin lill-ġisem jikkontrolla l-livelli tal-arginina, aċidu amino meħtieġ mill-ġisem tiegħek biex jagħmel il-proteini. Jekk l-arginina ma tkunx ikkontrollata, din tista' takkumula fil-ġisem u tikkawża sintomi, bħal problemi bil-kontroll tal-muskoli.

Loargys jintuża flimkien ma' modi oħra għall-ġestjoni tal-marda. Dawn jistgħu jinkludu:

- dieta b'kontenut baxx ta' proteini
- supplimenti tal-ikel b'aċidi amino essenzjali
- mediċini biex timmaniġġja sintomi oħra tal-marda, bħal mediċini li jbaxxu l-livelli ta' ammonja fil-ġisem tiegħek.

Kif jahdem Loargys

Pegzilarginase, is-sustanza attiva f'Loargys, tagħxi b'mod simili għall-enzima naturali arginase, li hija nieqsa jew mhijiex qed taħdem kif suppost f'pazjenti b'ARG1-D. Dan ibaxxi l-livelli tal-arginina fid-dem, u b'hekk jitnaqqsu s-sintomi tal-marda.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tinghata Loargys

Ma għandekx tinghata Loargys

- jekk kellek reazzjoni allergika severa għall-pegzilarginase jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (elenkati f'seazzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Loargys jista' jikkawża reazzjonijiet allergiċi. Dan huwa probabbli li jsehh wara l-ewwel ftit doži, iżda jista' jsehh ukoll aktar tard matul it-trattament.

Jekk possibbli, waqqaf l-ghoti immedjatement u segwi l-parir tat-tabib tiegħek, inkluż li tfittex għajnuna medika immedjata jekk tesperjenza xi wiehed mis-sintomi li ġejjin ta' reazzjoni allergika severa: horriqija, ħakk ġeneralizzat, għafis fis-sider, diffikultà biex tiehu nifs jew pressjoni tad-demm baxxa. It-tabib tiegħek jista' jiddeċiedi li għandek bżonn trattament mediku addizzjonali biex jew jipprevjeni jew jitratta reazzjoni allergika.

Matul it-trattament tiegħek, it-tabib tiegħek se jagħmel testijiet tad-demm biex jiċċekkja liema doża ta' Loargys hija tajba għalik.

Tfal u adolexxenti

Il-medicina ma għandhiex tintuża fi tfal taht is-sentejn, minħabba li mhuwiex magħruf jekk Loargys huwiex sigur u effettiv f'dan il-grupp ta' età.

Medicini ohra u Loargys

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu, hadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini ohra.

Tqala, treddigh u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tuża din il-medicina. Loargys mhuwiex rakkomandat għall-użu jekk inti tqila.

Mhuwiex magħruf jekk il-medicina tgħaddix fil-ħalib tas-sider. Jekk qed tredda', staqsi lit-tabib tiegħek għal parir qabel ma tiehu din il-medicina. It-tabib tiegħek ser jgħinek tiddeċiedi jekk għandekx twaqqaf it-treddigh jew twaqqafx it-trattament.

Sewqan u thaddim ta' magni

Loargys m'għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u thaddem magni.

Loargys fih is-sodium u l-potassium

Din il-medicina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri essenzjalment "mingħajr sodium". Din il-medicina fiha l-potassium, inqas minn 1 mmol (39 mg) għal kull doża, jiġifieri essenzjalment "mingħajr potassium".

3. Kif jinghata Loargys

Loargys ser jinghata lilek minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi l-ammont ta' Loargys mogħti lilek.

Id-doża tal-bidu rakkomandata ta' Loargys hija 0.1 mg għal kull kilogramma tal-piż tal-ġisem tiegħek meħuda darba fil-ġimgħa. Id-doża tista' tiżdied jew titnaqqas mit-tabib tiegħek biex iżomm il-livelli ta' arginina fid-demm tiegħek taht kontroll. It-tabib tiegħek ser jagħmel testijiet tad-demm regolari biex jiċċekkja l-livelli ta' arginina fid-demm tiegħek u jibdel id-doża tiegħek jekk ikun meħtieġ.

Loargys jinghata bħala infużjoni (dripp) direttament fil-vina tiegħek jew bħala injezzjoni taht il-ġilda, kif ikkunsidrat xieraq mit-tabib tiegħek.

It-tabib tiegħek jista' jiddeċiedi li tista' tinghata Loargys id-dar, bħala injezzjoni taht il-ġilda. Wara li tiġi mħarreġ mit-tabib jew mill-infermier, tista' tinjetta Loargys inti stess, ara l-istruzzjonijiet f' sezzjoni 7 hawn taht.

Dejjem għandek tuża din il-medicina eżatt kif deskritt f'dan il-fuljett jew skont il-parir tat-tabib, tal-ispiżjar jew tal-infermier tiegħek. Iċċekkja mat-tabib, spiżjar, jew infermier tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Jekk tinghata Loargys aktar milli suppost

It-tabib tiegħek ser jiżgura li tircievi l-ammont it-tajjeb ta' Loargys. Jekk ingħatajt Loargys aktar milli suppost, il-livell ta' argġinina fid-demm tiegħek jista' jibaxxa wisq. Is-sintomi jistgħu jinkludu dardir, rimettar, dijarea u għeja. Jekk inti jew it-tabib tiegħek tissuspetta li ngħatajt Loargys aktar milli suppost, inti għandek tiġi mmonitorjat mill-qrib u tingħata t-trattament kif meħtieġ.

Jekk tinsa' tuża Loargys

Jekk insejt tiegħu doża ta' Loargys, ikkuntattja lit-tabib tiegħek biex jiskeda d-doża li jmiss malajr kemm jista' jkun. M'għandekx tingħata doża doppja biex tpatti għal doża li tkun insejt tiegħu u għandu jkun hemm mill-inqas 4 ijiem bejn id-doži.

Jekk tieqaf tuża Loargys

It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk għandekx tieqaf tuża Loargys. Jekk tieqaf tuża Loargys, il-livell ta' argġinina fid-demm tiegħek x'aktarx li jerga' jizdied.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10)

- Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni Is-sintomi jistgħu jinkludu uġiġ, nefha, irritazzjoni, ħmura u raxx madwar is-sit tal-injezzjoni.
- Reazzjoni allergika (sensittività eċċessiva) Is-sintomi jistgħu jinkludu nefha fil-wieċ, raxx tal-ġilda, ħmura f'daqqa fil-ġilda (fwawar) u diffikultà biex tiegħu n-nifs (qtuġ ta' nifs).

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji possibbli li mhuwiex elenkat f'din il-fulett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Loargys

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' skadenza li hija ddikjarata fuq it-tikketta. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Aħzen fi frigġ ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$). Tagħmlux fil-friża. Aħzen fil-kartuna sabiex tilqa' mid-dawl.

Ladarba jitneħħa mill-frigġ, Loargys jista' jinħażen għal saġhtejn f'temperatura ambjentali ta' ġewwa sa 25°C .

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Loargys

- Is-sustanza attiva hija pegzilarginase.

- Kull kunjett ta' 0.4 ml fih 2 mg pegzilarginase.
- Kull kunjett ta' 1 ml fih 5 mg pegzilarginase.
- Is-sustanzi l-oħra huma sodium chloride, potassium dihydrogen phosphate, dipotassium phosphate, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet. Loargys fih is-sodium u l-potassium, ara sezzjoni 2.

Kif jidher Loargys u l-kontenut tal-pakkett

Loargys huwa likwidu bla kulur sa kemxejn isfar jew kemxejn roża, ċar sa kemxejn opalexxenti (lewn il-perla), f' kunjett tal-ħġieġ ċar.

Kull pakkett fih kunjett 1 b' 0.4 ml jew 1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jitqieghdu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Immedica Pharma AB
113 63 Stokkolma
L-Iżvezja

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħhar f' 11/2025.

Din il-medicina kienet awtorizzata taht 'ċirkustanzi eċċezzjonali'. Dan ifisser li minhabba li l-marda hija rari kien impossibbli li tinkiseb informazzjoni kompluta dwar din il-medicina.

L-Aġenzija Ewropea għall-Medicini ser tirrevedi kull tip ta' informazzjoni ġdida dwar din il-medicina kull sena u dan il-fuljett ser jiġi aġġornat kif meħtieġ.

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <https://www.ema.europa.eu>. Hemm ukoll links għal siti elettronici oħra dwar mard rari u kura.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

Tista' wkoll issib dan il-fuljett u l-materjal regolatorju ta' taħriġ approvat fuq din il-medicina meta tiskennja l-kodiċi QR ta' hawn taht bi smartphone jew permezz tas-sit web

<http://www.loargyspatient.eu>.



7. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-passi ta' hawn taht jiddeskrivu kif tipprepara u tagħti Loargys id-dar, bħala injezzjoni taht il-ġilda. Jekk qed tinjetta din il-medicina inti stess, inti se titħarreg kif tipprepara u tinjetta Loargys mit-tabib jew l-infermier tiegħek.

Tinjettax din il-medicina inti stess sakemm ma tkunx irċevejt taħriġ u tkun fhimt il-passi.

It-tabib tieghek ser jippreskrivi d-doża korretta tieghek u jghidlek liema volum (f' ml) se tinjetta. Jista' jkollok bżonn aktar minn kunjett wiehed biex tiehu d-doża korretta u jista' jkollok bżonn taqşam id-doża totali f' aktar minn injezzjoni wahda. It-tabib jew l-infermier tieghek jghidulek eżattament x' inhu tajjeb għalik.

Kull kunjett jintuża darba biss, dejjem uża kunjett(i) gdid/godda għal kull doża.
Loargys m'għandux jithallat ma' soluzzjonijiet oħra għal injezzjoni jew infużjoni.
Thawwadx.



Preparazzjoni:




Kun żgur li għandek dak kollu li tehtieg għall-injezzjoni(jiet):

- Kunjett(i) ta' Loargys
- Siringa iggradata
- Labra wahda kbira (eż. 18 Gauge) għal kull kunjett, biex tiġbed id-doża
- Labra wahda żgħira (eż. 26-27 Gauge) għal kull injezzjoni
- Biċċiet bl-alkohol
- Kuxxinett ta' garża
- Stikk, jekk mehtieg
- Kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu


1. Iċċekkja l-isem u l-qawwa tal-kunjett(i) biex tiżgura li jkun fih il-mediċina korretta u li għandek l-għadd korrett ta' kunjetti f'idejk. Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-kartuna. Tużahx jekk il-prodott ikun skada.
2. Nehhi l-kunjett(i) ta' Loargys mhux miftuħ(in) mill-frigġ 15 sa 30 minuta qabel l-injezzjoni ppjanata biex is-soluzzjoni tkun tista' tilhaq it-temperatura tal-kamra. Tużax shana esterna.
3. Aħsel idejk
4. Is-soluzzjoni fil-kunjett għandha tkun mingħajr kulur sa kemxejn isfar jew kemxejn roża, ċara sa kemxejn opalexxenti (lewn il-perla). Tużax jekk is-soluzzjoni tkun imċajpra jew ikun fiha frak viżibbli.
5. Qiegħed il-kunjett fuq wiċċ ċatt u nadif. Nehhi t-tapp flip-off tal-plastik mill-kunjett.
6. Imsah il-parti ta' fuq tal-kunjett b'kampjun tal-alkohol u hallih jinxef bl-arja. Tmissx il-parti ta' fuq tal-kunjett u thallihx imiss ma' xi haġa oħra ladarba jintmesah.




Il-ġbid tas-soluzzjoni mill-kunjett:

1. Wahhal labra kbira mas-siringa iggradata. Nehhi l-għatu tal-labra.	
2. Iġbed il-planger lura biex tiġbed l-arja lejn is-siringa iggradata, ugwali għall-volum biex tiġbed mill-kunjett (f' ml).	
3. Żomm il-kunjett fuq wiċċ ċatt, dahhal bil-mod il-labra mis-sigill tal-gomma fil-kunjett. a) Għal kunjett wiehed jew l-ewwel wiehed: Il-ponta tal-labra m'għandhiex tmiss is-soluzzjoni sabiex jiġi evitat li tiffurma r-ragħwa. Mur għal pass 4. b) Għal kunjett(i) sussegwenti: Dawwar il-kunjett rasu 'l isfel biex taċċerta li ras il-labra tinsab fl-ispazju tal-arja fuq is-soluzzjoni sabiex	

tevita li tiffirma r-ragħwa.	
4. Imbotta l-plaġer bil-mod 'il ġewwa biex tinjetta l-arja fil-kunjett. 5. Żomm il-labra fil-kunjett u żommu rasu 'l isfel. Bil-labra fis-soluzzjoni, iġbed bil-mod il-plaġer sal-marka ugwali għall-volum meħtieġ.	
6. Qabel ma tneħhi l-labra mill-kunjett, iċċekkja s-soluzzjoni fis-siringa għall-bżieġaq tal-arja. Jekk ikun hemm xi bżieġaq, kompli żomm il-kunjett rasu 'l isfel bil-labra tipponta 'l fuq. Taptap bil-mod fuq il-kanna tas-siringa b'subgħajk. Ladarba l-bżieġaq tal-arja kollha jkunu fin-naħa ta' fuq, imbotta bil-mod il-plaġer biex timbotta l-bżieġaq 'il barra mill-labra.	
7. Iċċekkja l-volum li trid tagħti (f' ml) kontra l-immakar fis-siringa biex tkun ċert li inti għidt l-ammont korrett ta' soluzzjoni.	
8. Iġbed il-labra mill-kunjett, poġġi l-għatu tal-labra lura f' postu u armih fil-kontenitur tiegħek tal-oġġetti li jaqtgħu u bil-ponta .	
9. Għandek mnejn ikollok tuża diversi kunjetti biex tiġbed il-volum sħiħ (f' ml). Biex tagħmel hekk, irrepeti passi 1-8 t'hawn fuq għal kull kunjett meħtieġ biex tinkiseb id-doża totali (f' ml) jew kif muri lilek mit-tabib jew l-infermier tiegħek. Dejjem segwi l-istruzzjonijiet mogħtija lilek mit-tabib jew l-infermier tiegħek. Jekk jogħġbok innota li għal kull kunjett għdid għandek ukoll tuża labra għdida.	
10. Qiegħed labra żgħira fuq is-siringa mimlija lesta, tneħħix l-għatu tal-labra. Aċċerta ruħek li l-labra tkun issikkata. Nota: Jekk is-soluzzjoni mhix ser tintuża minnufih, ipprotegi s-siringa mid-dawl. Wara li jithejja, Loargys jista' jinżamm fit-temperatura ambjentali tal-kamra (sa 25 °C) għal sa sagħtejn qabel l-ghoti. Wara dan il-hin, Loargys imhejji ma jistax jintuża darb'ohra u għandu jintrema.	

Kif tagħti d- doża:

1. Neħhi l-għatu tal-labra. Żomm is-siringa bil-labra tipponta 'l fuq u taptap il-kanna tas-siringa b'subgħajk biex tneħhi kwalunkwe bżieġaq tal-arja. Ikkontrolla viżwalment li l-volum li jkun hemm fis-siringa huwa korrett. Il-volum għal kull injezzjoni ma għandux jaqbeż il-1 ml. Jekk dan ikun il-każ, għandhom jiġu injettati injezzjonijiet multipli f'siti differenti.	
2. Aghżel post għall-injezzjoni (iż- żaqq, il-ġenb tal-koxxa, jew il-ġenb jew in-naħa ta' wara tal-parti ta' fuq tad-driegħ). Aghmel rotazzjoni tas-siti tal-injezzjoni bejn id-doži. Tinjetta f'tessut ta' ċikatriċi jew f'partijiet li jkunu ħomor, infjammati, jew minfuħin. Jekk tinjetta fl-addome, evita ż-żona direttament madwar iż-żokra. Jekk tkun meħtieġa aktar minn injezzjoni waħda għal doża waħda ta' Loargys, is-siti tal-injezzjoni għandhom ikunu mill-inqas 3 cm 'il bogħod minn xulxin.	
3. Naddaf is-sit tal-injezzjoni bl-użu ta' swab tal-alkohol u halli l-gilda tinxef.	

4. Oqros bil-mod il-ġilda tas-sit tal- injezzjoni magħżul bejn is-saba' l-kbir u s-saba' l-werrej.	
5. Żomm is-siringa b'hal lapas jew dart. Dahhal il-labra fil-ġilda mghollija f'angolu ta' 45° sa 90°.	
6. Waqt li tibqa' toqros il-ġilda, imbotta l-planger bil-mod sakemm inti tkun injettajt il-volum mixtieq. Ftakar: Jekk tehtieg tinjetta volum ta' aktar minn 1 ml ta' Loargys ibdel is-sit ta' injezzjoni u aċċerta li s-sit tal-injezzjoni ġdid huwa aktar minn 3 cm 'il bogħod. Bil-mod aghfas il-planger 'l isfel sakemm tkun injettajt il-volum mehtieg. Irrepeti sakemm tkun injettajt id-doża totali tieghek (f'ml). Dejjem uża labra żghira ġdida għal kull injezzjoni.	
7. Nehhi s-siringa billi tigbed dritt 'il barra. Ohroġ il-ġilda maqrusa u aghfas b'gentilezza pad b'garża fuq is-sit tal-injezzjoni għal ftit sekondi. Applika stikk jekk ikun mehtieg.	
8. Poġġi s-siringa, il-labar u l-ġhotjen użati fil-kontenitur. Il-kunjetti użati, anki jekk ma jkunux vojta, għandhom jiġu mormija skont il-linji gwida lokali tieghek.	

Innota d-data tal-injezzjoni u s-siti kollha fejn inti injettat. Dan jgħinek tuża sit tal-injezzjoni differenti għall-injezzjoni li jmiss.

It-taghrif li jmiss qed jinghata biss għall-professjonisti tal-kura tas-sahha biss:

Loargys huwa maħsub għal infużjoni fil-vini jew injezzjoni taht il-ġilda. Uża teknika asettika meta tipprepara u tagħti Loargys.

Thawwadx.

Struzzjoni għall-preparazzjoni

- Iddetermina l-volum totali ta' Loargys li għandu jinghata (u l-ġhadd ta' kunjetti mehtieġa) abbażi tal-piż u l-livell ta' doża tal-pazjent.
- Nehhi l-kunjett(i) mill-frigġ biex tilhaq it-temperatura tal-kamra.
- Qabel l-ġhoti, spezzjona l-kunjett viżwalment għal materja partikolata u skulurazzjoni.
 - Loargys huwa likwidu bla kulur sa kemxejn isfar jew kemxejn roża, ċar sa kemxejn opalexenti, essenzjalment hieles minn partiċelli barranin viżibbli.
 - Armi l-kunjett(i) mhux konsistenti ma' din id-dehra.
- Iġbed id-doża indikata fis-siringa.
- L-istabbiltà kimika u fiżika għad-doża ppreparata ntweriet għal saġhtejn meta tinhażen f' temperatura ambjentali sa 25 °C jew sa 4 sigħat jekk tinhażen fi frigġ f' temperatura ta' 2 °C sa 8 °C. Jekk il-prodott ma jintużax f'dawn il-perjodi ta' żmien, għandu jintrema. Minn perspettiva mikrobijoloġika, il-prodott għandu jintuża immedjatament wara r-rikostituzzjoni.

Għal għoti ġol-vini

- Iddilwixxi b'soluzzjoni għall-injezzjoni ta' sodium chloride 9 mg/ml (0.9 %) biex tikseb il-volum mixtieq ta' infużjoni (koncentrazzjoni massima ta' pegzilarginase 0.5 mg/ml).
- Agħti l-infużjoni għol-vini fuq perjodu ta' mill-inqas 30 minuta.
- Thallatx medicini oħra ma' Loargys jew ma' tinfużax medicini oħra fl-istess hin permezz tal-istess linja ta' aċċess għol-vini.

Għal għoti taht il-ġilda

- Agħti s-soluzzjoni mhux dilwita bħala injezzjoni taht il-ġilda fl-addome, fil-parti laterali tal-koxxa, jew fil-ġenb jew fil-parti ta' wara tan-naħa ta' fuq tad-dirgħajn. Aghmel rotazzjoni tas-siti tal-injezzjoni bejn id-dożi.==
- Tinjettax f'tessut ta' ċikatriċi jew f'partijiet li jkunu ħomor, infjammati, jew minfuħin.
- Jekk tinjetta fl-addome, evita ż-żona direttament madwar iż-żokra.
- Jekk tkun meħtieġa aktar minn injezzjoni waħda għal doża waħda ta' Loargys, is-siti tal-injezzjoni għandhom ikunu mill-inqas 3 cm 'il bogħod minn xulxin.

Armi kwalunkwe parti mhux użata tal-medicina.

L-ebda htigijiet speċjali għar-rimi.